

Aktivitas Antioksidan Jus Stroberi (*Fragaria ananassa* Duchessesne) Terhadap Kadar SGPT, SGOT dan MDA pada Tikus Jantan Galur Wistar yang Diinduksi Isoniazid

by Ebta Narasukma Anggraeny

Submission date: 12-Mar-2022 03:22PM (UTC+0700)

Submission ID: 1782582611

File name: 4_30337-68674-2-PB_strawbery_sgot_sgpt.docx (52.04K)

Word count: 2818

Character count: 17059

Aktivitas Antioksidan Jus Stroberi (*Fragaria ananassa Duchesse*) Terhadap Kadar SGPT, SGOT dan MDA pada Tikus Jantan Galur Wistar yang Diinduksi Isoniazid

Ebta Narasukma Anggraeny, Endang Sri Sunarsih,
Patricia Sanggita Listyoputri Wibowo, Novi Elisa

ABSTRACT

Isoniazid is an anti-tuberculosis drug that is used either as monotherapy or in combination. Prolonged use of isoniazid can cause hepatotoxicity. Hepatotoxicity is caused by the hepatic isoniazid metabolism in the form of *hydrazine* and *acetylhydrazine*. These free radicals cause high *reactive oxygen species* (ROS) in the body. The high level of free radicals causes an increase in SGPT and SGOT levels, which are indicators of liver damage. The high level of free radicals in the body can be seen from the MDA parameter. This can be overcome by giving exogenous antioxidants such as strawberry juice (*Fragaria ananassa Duchesse*). The purpose of this study was to determine the phytochemical screening of strawberry juice and the effect of giving strawberry juice on the levels of SGPT, SGOT and MDA in rats induced by Isoniazid. The treatment was given for 14 days divided into groups, namely normal control, negative control, positive control, dose of 3g / kg, 6g / kg, and 9g / kg of body weight. Data were collected on day 1, day 15, and day 29. The results of this study concluded that strawberry juice can reduce levels of SGPT, SGOT and MDA in isoniazid-induced rats with an effective dose of 3 g/kgBW rats.

Keywords: Isoniazid; Strawberry juice; SGPT; SGOT; MDA

PENDAHULUAN

Masalah kesehatan semakin meluas dengan adanya beberapa penyakit yang berbahaya salah satunya penyakit tuberculosis

(TB). Tuberculosis adalah penyakit menular oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet oleh orang yang terinfeksi

bateri tersebut. Isoniazid adalah obat antituberkulosis (OAT), baik sebagai monoterapi atau dalam kombinasi dengan obat TB lainnya (Rahman, 2013). Penggunaan isoniazid sebagai OAT dapat menyebabkan terjadinya *drug induced liver injury* (DILI) atau kerusakan hepatosit (Pillai *et al.*, 2012).

Hepatotoksik akibat isoniazid disebabkan oleh reaksi radikal bebas dari hasil metabolisme isoniazid di hepar berupa hidrazin dan asetilhidrazin. Metabolit reaktif (asetilhidrazin dan hidrazin) akan memicu terjadinya asetilasi makromolekul yang menyebabkan terjadinya *protein binding* di hepar dan penurunan aktivitas glutathion yang merupakan pendetoksifikasi *reactive oxygen species* (ROS). Kedua mekanisme tersebut akan mengakibatkan peroksidasi lemak dan gangguan sintesis protein sehingga terjadi kerusakan hepatosit (Lian *et al.*, 2013).

Indikasi adanya kerusakan pada hepar adalah dengan terlepasnya enzim SGPT dan SGOT ke dalam serum. SGPT paling sering digunakan sebagai parameter kerusakan hepar karena SGPT dihasilkan oleh hepar. SGOT terdapat pada hepar, otak, ginjal, otot rangka, dan jantung. Oleh karena itu SGPT dan SGOT sering digunakan sebagai indikator adanya kerusakan hepar (Peanasari *et al.*, 2015).

Peningkatan kadar SGPT dan SGOT di dalam darah dapat dipicu oleh adanya radikal bebas yang berlebihan di dalam tubuh. Kerusakan sel akibat radikal bebas pada dasarnya dapat diatasi oleh antioksidan endogen, namun apabila radikal yang terdapat di dalam tubuh berlebihan, maka dibutuhkan antioksidan eksogen untuk menetralkan radikal bebas yang terbentuk (Reynertson, 2007).

Radikal bebas akan menginduksi terjadinya peroksidasi lipid. Peroksidasi lipid akan merusak sel karena strukturnya tidak stabil dan mencari pasangan elektron lainnya dari membran sel dengan cara memecah asam lemak tidak jenuh atau PUFA (*poly unsaturated fatty acid*) yang dapat menghasilkan MDA (*malondialdehid*). Biomarker adanya radikal bebas yang tidak dapat dinetralkan oleh antioksidan dalam tubuh adalah MDA (Ayala *et al.*, 2014).

Salah satu antioksidan eksogen yang berasal dari alam adalah stroberi. Stroberi merupakan buah yang sering dikonsumsi oleh masyarakat dan mudah didapat. Stroberi memiliki kandungan antioksidan dan senyawa

fenolik sebesar 243,3mg/kg–290,4mg/kg buah segar (Oszmiański & Wojdyło, 2009). Kelas utama senyawa fenolik diwakili oleh flavonoid terutama anthocyanin (Kähkönen *et al.*, 2001). Kemudian diikuti oleh tanin dan asam fenolat (Aaby *et al.*, 2005).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui skrining fitokimia jus stroberi dan aktivitas antioksidan jus stroberi. Aktifitas antioksidan jus stroberi dapat dilihat dari kadar SGPT, SGOT, dan MDA pada tikus jantan galur wistar yang diinduksi Isoniazid. Dosis Isoniazid yang digunakan untuk induksi sebesar 200mg/kgBB tikus.

16 METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan *Pre and Post test Randomized Control Group Design*. Penelitian dilakukan pada bulan Februari 2020 sampai Juli 2020. Penelitian dilakukan di Laboratorium Farmakologi Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang. Penelitian ini sudah mendapatkan persetujuan etik nomor 094/CN/SW/KEPK-STIFAR/EC/I/2020.

Bahan

Bahan yang digunakan adalah buah stroberi, hewakuji tikus galur Wistar jantan, silika GF254, aquadestilata, isoniazid dari PT Phapros, Curcumin pa, CMC Na, 1,1,3,3-tetrametoksipropana (TMP), trikloroasetat (TCA), asam tiobarbiturat (TBA), aquadestilata, asam asetat glasial, AST/ SGOT dan ALT/ SGPT *Elitech Clinical System* yang diperoleh dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang.

Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan (digital dan analitik), juicer, *beaker glass*, corong kaca, batang pengaduk, tabung *sentrifuge*, pipa kapiler, gelas ukur, kandang hewan, spuit injeksi dengan jarum berujung tumpul (sonde), *sentrifuge* (*Gemmy centrifuge PLC-05*), mikropipet, asbes, thermometer, statif, klem, *Spektrofotometer UV-VIS*, dan *Spectrophotometric Mikrolab 300*.

Pembuatan Jus Stroberi

Buah segar yang telah disortasi, dicuci, dibersihkan dari bagian daunnya kemudian ditimbang sesuai perhitungan. Buah dimasukkan ke dalam juicer dan sari

ditampung dalam wadah. Sari jus buah stroberi dimasukkan ke dalam gelas ukur untuk mengetahui volume yang didapat. Sari jus stroberi dimasukkan ke dalam botol yang terlindung dari cahaya matahari dan disimpan di dalam lemari es.

Skrining Fitokimia Jus Stroberi

Uji pendahuluan yang dilakukan meliputi:

1. Flavonoid

11 Jus stroberi sebanyak 0,5 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambah dengan serbuk Mg (± 100 mg) dan 1 ml HCl pekat, lalu ditambahkan amil alkohol (± 2 ml), gojog kuat-kuat dan dibiarkan hingga memisah, diamati perubahannya (Horne, 1987). Adanya senyawa flavonoid ditandai dengan terbentuknya warna merah atau orange pada senyawa amil alkohol (Endarini, 2016).

2. Tanin

Jus stroberi sebanyak 0,5 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi ditambah NaCl 10%, kemudian disaring dan diambil filtratnya. Filtrat kemudian dibagi menjadi dua yaitu filtrat A dan B. Filtrat A ditambahkan gelatin 1%. Hasil positif jika terbentuk endapan putih. Filtrat B ditambah larutan $FeCl_3$ 10%. Hasil positif terjadi warna hijau gelap atau hijau kebiruan (Endarini, 2016).

3. Saponin

6 Jus stroberi sebanyak 0,5 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 10 ml air panas, didinginkan dan kemudian dikocok kuat-kuat selama 10 detik. Reaksi positif jika terbentuk buih yang stabil selama tidak kurang dari 10 menit, setinggi 1 cm sampai 10 cm. Pada penambahan 1 tetes asam klorida 2 N buih tidak hilang (Depkes RI, 1979).

4. Alkaloid

Jus stroberi sebanyak 0,5 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi kemudian dicampur dengan 1 ml HCl 2N dan 9 ml aquadest panas. Larutan dipanaskan selama 2 menit, kemudian didinginkan 11n disaring. Filtrate dimasukkan kedalam 2 tabung reaksi. Tabung pertama ditambahkan pereaksi Dragendroff dan tabung kedua ditambahkan pereaksi Mayer (Depkes RI, 1995). Hasil positif alkaloid ditandai dengan terbentuknya endapan berwarna coklat kemerahan jika ditambahkan pereaksi Dragendroff dan terbentuk endapan putih jika ditambahkan pereaksi meyer (Endarini, 2016).

5. Steroid dan Triterpenoid

Jus stroberi sebanyak 0,5 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi dicampur dengan eter, kemudian disaring dan diambil filtratnya. Filtrat tersebut diuapkan dalam cawan penguap hingga diperoleh residu. Residu 7 ditambah 2 tetes asam asetat anhidrat dan 1 tetes asam sulfat pekat. Adanya senyawa golongan terpenoid ditandai dengan timbulnya warna merah sedangkan adanya senyawa golongan steroid ditandai dengan timbulnya warna biru (Endarini, 2016).

Uji Penegasan atau KLT Jus Stroberi

Fase diam yang digunakan adalah silika GF254 dan fase gerak yang digunakan meliputi :

1. Flavonoid 4

Eluen yang digunakan adalah n-butanol :asam asetat glasial :air (4:1:5). Eluen dijenuhkan lalu diambil fase n-butanol. Penampak bercak yang digunakan yaitu uap ammonia. Noda dengan warna kuning kecoklatan menunjukkan adanya kandungan flavonoid (Robinson, 1995).

2. Tanin

Eluen yang digunakan adalah toluene: etil asetat (3:1). Penampak bercak yang digunakan yaitu $FeCl_3$. Noda dengan warna hijau kehitaman menandakan adanya senyawa tanin (Robinson, 1995).

3. Saponin

Eluen yang digunakan adalah kloroform: methanol: air (64:50:10). Penampak bercak yang digunakan yaitu anisaldehyd asam sulfat kemudian dioven dengan suhu $100^\circ C$ selama 5-10 menit. Warna hijau atau biru pada sinar tampak menunjukkan adanya senyawa saponin (Nuria *et al.*, 2009).

4. Alkaloid

Eluen yang digunakan adalah etil asetat: metanol: air (100:13,5:10). Penampak bercak yang digunakan yaitu pereaksi dragendroff. Senyawa alkaloid akan membentuk warna coklat atau jingga (Arifin *et al.*, 2006)

5. Triterpenoid 4

Eluen yang digunakan adalah toluen: etil asetat (93 : 7). Penampak bercak yang digunakan yaitu anisaldehyd-asam sulfat. Lempong dioven $110^\circ C$ selama 5-10 menit. Senyawa triterpenoid akan membentuk noda berwarna merah ungu, ungu tua, hijau biru, merah (Hayati *et al.*, 2012).

Perlakuan Hewan Coba

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 30 ekor tikus dan dibagi menjadi 6 kelompok yaitu kelompok I (kontrol normal), kelompok II (CMC Na 0,5%), kelompok III (*Curcumin* 50mg/kgBB), kelompok IV (3g/kgBB), kelompok V (6g/kgBB), dan kelompok VI (9g/kgBB). Diukur kadar SGPT, SGOT dan MDA pada hari ke-1 atau sebelum perlakuan. Pada kelompok I diberikan pakan standart (*rat bio*) dan minum sedangkan pada kelompok II, III, IV, V, dan VI diberikan induksi isoniazid 200 mg/kgBB selama 14 hari. Diukur kembali kadar SGPT, SGOT dan MDA pada hari ke-15. Selanjutnya diberikan perlakuan sesuai kelompok masing-masing selama 14 hari. Diukur kadar SGPT, SGOT, dan MDA pada hari ke-29. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan SPSS versi 19.

Pengukuran Kadar MDA

Plasma sebanyak 200µl di masukkan tabung centrifuge. Ditambahkan 1,0ml TCA 20% dan 1,0ml TBA 1%. TBA dibuat dengan pelarut asam asetat glasial 50%. Larutan kemudian divortex. Larutan diinkubasi selama 45 menit pada suhu 95°C, lalu didinginkan. Larutan disentrifugasi dengan kecepatan 6000 rpm selama 15 menit. Supernatan dibagian atas diambil dan dimasukkan ke dalam tabung baru. Absorbansi sampel diukur menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada λ 532 nm (Momuat *et al.*, 2011).

Pengukuran Kadar SGPT dan SGOT

Pada pengukuran kadar SGPT dan SGOT menggunakan sampel berupa serum darah. Jumlah serum yang diukur sesuai dengan SOP pada *Elitech Clinical System*. Reagen yang digunakan yaitu AST dan ALT dari *Elitech Clinical System*. Alat yang digunakan yaitu *Spectrophotometric Mikrolab 30*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji pendahuluan (skrining fitokimia) dan KLT (Kromatografi Lapis Tipis) jus stroberi dapat dilihat pada Tabel 1.

Uji skrining fitokimia adalah untuk mengetahui senyawa metabolit sekunder yang terkandung dalam jus stroberi. Dari hasil pengujian diketahui jus stroberi positif mengandung flavonoid, alkaloid, tanin dan saponin. Senyawa yang paling banyak terkandung di dalam buah stroberi yaitu

ellagitannin, antosianin dan flavonol. Flavonol yang diidentifikasi dalam buah stroberi yaitu turunan quersetin dan kaempferol (Aaby *et al.*, 2007).

Table 1. Hasil Skrining Fitokimia dan KLT

Senyawa	Hasil	
	Skrining	KLT
Flavonoid	+	Rf 1 : 0,76 Rf 2 : 0,59
Alkaloid	+	Rf : 0,73
Tanin	+	Rf : 0,39
Saponin	+	Rf : 0,48
Steroid/ Triterpenoid	-	Rf : -

(+) Menunjukkan hasil positif

(-) Menunjukkan hasil negatif

Jus stroberi diorientasi volume jusnya untuk mengetahui berapa besar volume yang didapat pada buah segar. Buah stroberi segar ditimbang sebanyak 30gr, lalu dijuicer. Hasil orientasinya yaitu dalam 30 gr buah stroberi menghasilkan volume jus sebesar 20,38 ml.

Uji aktivitas farmakologi dilakukan pada hewan uji. Uji ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas antioksidan jus stroberi dalam menurunkan kadar SGPT, SGOT dan MDA. Kadar normal SGPT dalam darah yaitu 18-45 U/L (Giknis & Clifford, 2008). Kadar normal SGOT pada tikus jantan yaitu 5,7-80,8 U/L (Mitruka & Rawnsley, 1981).

Hasil pengukuran kadar SGPT, SGOT dan MDA pada semua kelompok dapat dilihat pada Tabel 2, 3, dan 4. Pada hari ke-1 menunjukkan kadar SGPT, SGOT dan MDA dalam keadaan normal. Pada hari ke-15 menunjukkan kadar setelah induksi Isoniazid dosis 200 mg/KgBB tikus. Pada Hari ke-29 menunjukkan kadar setelah pemberian jus stroberi. Peningkatan kadar pada hari ke-15 terjadi karena adanya radikal bebas. Radikal bebas ini berasal dari metabolisme isoniazid di hati.

Uji parametrik dilakukan pada persen penurunan kadar SGPT, SGOT, dan MDA. Uji parametrik ini menggunakan *One-Way Anova* dengan taraf kepercayaan 95%. Hasil uji *One-Way Anova* untuk persentase penurunan kadar SGOT dan MDA menunjukkan adanya perbedaan kadar antara kelompok dengan hasil SGOT $p=0,015$, dan MDA $p=0,000$. Pada SGPT menunjukkan nilai $p=0,230$ berarti tidak ada perbedaan kadar antar kelompok. Pada penelitian ini dilakukan uji lanjut, yaitu uji *Post-hoc LSD*

untuk melihat nilai signifikansi antar kelompok.

Hasil uji *Post-hoc LSD* pada kelompok kontrol positif dibandingkan dengan kelompok jus stroberi (*Fragaria ananassa Duchesse*) dosis 3g/kgBB, 6g/kgBB, dan 9g/kgBB menunjukkan hasil signifikan. Hal tersebut menjelaskan bahwa jus stroberi dosis 3g/kgBB, 6g/kgBB, dan 9g/kgBB mampu

menurunkan kadar SGPT, SGOT, dan MDA tikus yang diinduksi Isoniazid sebanding dengan kontrol positif yaitu *Curcumin* pa dosis 50mg/kgBB tikus. Hal ini menjadi dasar dalam memilih dosis efektif jus stroberi bahwa dosis 3g/kgBB merupakan dosis efektif untuk menurunkan kadar SGPT, SGOT, dan MDA tikus.

Tabel 2. Rerata±SD Hasil Pengukuran Kadar SGPT dan Persen Penurunan Kadar SGPT

Kelompok	Rerata±SD (U/l)			% Penurunan	Anova (Sig.)
	Hari 1	Hari ke-15	Hari ke-29		
Kontrol Normal	62,00 ± 20,19	74,40 ± 10,29	71,20 ± 17,28	5,25 ± 11,40	
Kontrol Negatif (CMC Na 0,5%)	57,00 ± 8,89	70,80 ± 27,52	66,60 ± 21,88	4,07 ± 9,77	
Kontrol Positif (Curcumin 50mg/KgBB)	38,20 ± 7,19	63,60 ± 21,45	46,80 ± 4,38	18,17 ± 32,16	
Jus stroberi 3g/KgBB	50,60 ± 8,26	73,00 ± 18,92	58,60 ± 10,41	15,47 ± 24,04	0,230
Jus stroberi 6g/KgBB	47,80 ± 7,92	75,20 ± 21,28	46,00 ± 11,31	35,11 ± 20,43	
Jus stroberi 9g/KgBB	54,80 ± 11,90	70,40 ± 21,05	56,40 ± 15,47	17,45 ± 16,74	

Tabel 3. Rerata±SD Hasil Pengukuran Kadar SGOT dan Persen Penurunan Kadar SGOT

Kelompok	Rerata±SD (U/l)			% Penurunan	Anova (Sig.)
	Hari 1	Hari ke-15	Hari ke-29		
Kontrol Normal	155,00 ± 63,70	141,20 ± 30,93	155,40 ± 23,70	-13,43 ± 23,54	
Kontrol Negatif (CMC Na 0,5%)	153,80 ± 42,54	197,40 ± 39,74	183,00 ± 13,82	5,40 ± 12,52	
Kontrol Positif (Curcumin 50mg/KgBB)	132,80 ± 41,98	178,60 ± 81,14	116,20 ± 6,26	25,94 ± 25,56	0,015
Jus stroberi 3g/KgBB	150,00 ± 45,11	165,00 ± 60,44	116,20 ± 13,92	24,00 ± 20,49	
Jus stroberi 6g/KgBB	129,20 ± 29,41	226,20 ± 70,98	143,40 ± 24,98	32,29 ± 21,45	
Jus stroberi 9g/KgBB	159,60 ± 30,48	219,40 ± 39,72	175,20 ± 6,57	18,15 ± 14,02	

Tabel 4. Rerata±SD Hasil Pengukuran Kadar MDA dan Persen Penurunan Kadar MDA

Kelompok	Rerata±SD (µM)			% Penurunan	Anova Sig.
	Hari 1	Hari ke-15	Hari ke-29		
Kontrol Normal	50,9 ± 5,74	55,56 ± 5,33	54,37 ± 1,10	1,39 ± 8,00	
Kontrol Negatif (CMC Na 0.5%)	48,09 ± 11,04	85,39 ± 7,75	76,78 ± 6,40	9,90 ± 4,35	
Kontrol Positif (Curcumin 50mg/KgBB)	47,57 ± 5,65	75,73 ± 7,63	56,99 ± 19,90	24,98 ± 8,29	
Jus stroberi 3g/KgBB	47,04 ± 5,85	78,06 ± 5,20	59,65 ± 5,27	23,65 ± 2,93	0,000
Jus stroberi 6g/KgBB	47,90 ± 4,41	79,40 ± 4,97	52,18 ± 6,19	34,41 ± 4,55	
Jus stroberi 9g/KgBB	45,52 ± 3,36	77,49 ± 6,15	44,76 ± 3,85	42,14 ± 4,48	

Hasil uji *Post-hoc LSD* Pada kelompok kontrol positif dibandingkan dengan kelompok jus stroberi dosis 3 g/kgBB, 6 g/kgBB, dan 9 g/kgBB menunjukkan hasil berbeda tidak signifikan. Hal tersebut menjelaskan bahwa jus stroberi dosis 3 g/kgBB, 6 g/kgBB dan 9 g/kgBB mampu menurunkan kadar SGPT, SGOT, dan MDA tikus yang diinduksi Isoniazid sebanding dengan kontrol positif yaitu Curcumin pada dosis 50mg/kgBB tikus. Hal ini menjadi dasar dalam pemilihan dosis efektif jus stroberi bahwa dosis 3 g/kgBB merupakan dosis efektif untuk menurunkan kadar SGPT, SGOT, dan MDA tikus.

Isoniazid yang digunakan sebagai induksi dengan dosis 200mg/KgBB tikus dapat menimbulkan kerusakan hepar. Kerusakan sel hepar yang terjadi disebabkan oleh metabolit toksik Isoniazid (*hydrazine*) yang dimetabolisme oleh enzim cytochrome P450 terutama isoform CYP3A4 di hepar (Chen & Raymond, 2006). Produksi *hydrazine* yang berlebihan akan membuat *hydrazine* terakumulasi di dalam hepar dan mengakibatkan peningkatan jumlah produksi radikal bebas (ROS/RNS) yang akan menyebabkan stress oksidatif di hepar (Kumar & Ramesh, 2014).

Peningkatan jumlah produksi ROS akibat pemberian Isoniazid berdampak pada kadar SGPT dan SGOT. Serum Glutamate Pyruvat Transaminase (SGPT) dan Serum Glutamate Oxalacetate Transaminase (SGOT) di dalam darah merupakan indikator kerusakan sel hati. SGPT merupakan enzyme spesifik di hati. Kadar SGPT yang tinggi merupakan indikasi kerusakan hati, kemudian

peningkatan SGPT secara signifikan merupakan indikasi kerusakan hati akut (Agrawal *et al.*, 2013). Aktivitas sel yang sangat tinggi dapat menyebabkan kerusakan hepatosit yang selanjutnya terjadi pelepasan enzim tersebut ke dalam aliran darah, sehingga kadar SGPT meningkat (Saraswati, 2015). SGOT dan SGPT akan keluar menuju ekstraseluler dan masuk ke dalam peredaran darah ketika terjadi kerusakan pada sel hepar sehingga terjadi peningkatan kadarnya di dalam darah yang merupakan salah satu diagnosis terjadinya *drug induced liver injury* (DILI) (Arika *et al.*, 2016)

Peningkatan jumlah produksi ROS akibat pemberian Isoniazid berdampak pada kadar MDA. MDA (*malondialdehid*) merupakan suatu radikal bebas hasil dari metabolit lipid peroksida. Lipid peroksida terbentuk karena kelebihan produk reactive oxygen specis (ROS) yang menyerang komponen sel (membran lipid dan protein) dengan melibatkan residu asam lemak ganda dari fosfolipid yang sangat sensitif terhadap oksigen (Valko *et al.*, 2007). Jadi semakin tinggi peningkatan produksi ROS akan berdampak pada peningkatan lipid peroksida yang mengakibatkan tingginya kadar MDA pada tikus yang diinduksi Isoniazid.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa jus stroberi mampu menurunkan kadar SGPT, SGOT, dan MDA. Hal ini dapat terjadi karena jus stroberi mengandung senyawa flavonoid, alkaloid, tannin, saponin, vitamin C dan antosianin. Selain itu buah stroberi diduga mengandung senyawa marker quersetin (Aaby *et al.*, 2007). Senyawa-senyawa tersebut yang memiliki peran sebagai antioksidan.

Flavonoid merupakan antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat ROS (*Reactive Oxygen Species*) berperan sebagai *scavenger* radikal bebas yang berikatan langsung dengan ROS dan meningkatkan aktivitas antioksidan endogen serta sebagai inhibitor aktivitas CYP3A (Wu *et al.*, 2006). Vitamin C dan tannin yang terdapat dalam jus stroberi memiliki efek sebagai hepatoprotektor dengan bertindak sebagai *scavenger* radikal bebas yang berikatan langsung dengan radikal bebas ataupun metabolit toksik obat (Hassnin *et al.*, 2013) (Gülçin *et al.*, 2010). Senyawa alkaloid yang terdapat pada jus stroberi (*Fragaria ananassa Duchesne*) dapat melindungi hepar dari paparan senyawa kimia yang menyebabkan timbulnya radikal bebas (Raj *et al.*, 2010). Senyawa alkaloid juga dapat menghambat kerusakan oksidatif jaringan pada tikus (Untari *et al.*, 2014). Senyawa saponin juga ikut berperan dalam memperbaiki kerusakan pada hepar serta menurunkan kadar enzim pada hepar (Withawaskul *et al.*, 2003). Antosianin memiliki aktivitas antioksidan dengan mengkelat ion logam (Miguel, 2011). Quersetin memiliki efek scavenging radikal bebas yang mampu menghambat peroksidasi lipid dan meningkatkan kapasitas antioksidan tubuh (Xu *et al.*, 2019).

Berbagai kandungan di dalam buah stroberi mampu menurunkan kadar SGPT, SGOT, dan MDA. Hal ini dikarenakan kandungan metabolit di dalam buah stroberi berperan aktif dalam melawan radikal bebas (*scavenger free radicals*), melindungi tubuh dari kerusakan sel, serta memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi karena kandungan senyawa fenoliknya yang tinggi.

KESIMPULAN

Jus stroberi memiliki aktivitas antioksidan yang berperan sebagai hepatoprotektor yang mampu melawan radikal bebas hasil metabolisme isoniazid yaitu hidrazin dan asetilhidrazin. Pemberian jus stroberi dapat menurunkan kadar SGPT, SGOT, dan MDA pada tikus yang diinduksi isoniazid. Dosis efektif jus stroberi yang dapat menurunkan SGPT, SGOT, dan MDA adalah 3g/kgBB tikus.

Aktivitas Antioksidan Jus Stroberi (*Fragaria ananassa* Duchesse) Terhadap Kadar SGPT, SGOT dan MDA pada Tikus Jantan Galur Wistar yang Diinduksi Isoniazid

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

es.scribd.com

Internet Source

4%

2

Endang Sri Sunarsih, Ebta Narasukma Anggraeny, Patricia Sanggita Listyoputri Wibowo, Novi Elisa. "Phytochemical Screening and Antioxidant Activity of Strawberry Juice (*Fragaria ananassa* Duchesse) Against Ureum Level, Creatinin, and Enzyme Catalase Activity In Isoniazid-Induced Wistar Male Rats", STRADA Jurnal Ilmiah Kesehatan, 2020

Publication

3%

3

ejournal.umm.ac.id

Internet Source

3%

4

id.123dok.com

Internet Source

2%

5

onesearch.id

Internet Source

2%

6

digilib.unila.ac.id

Internet Source

2%

7 eprints.umm.ac.id
Internet Source

2%

8 repository.ub.ac.id
Internet Source

1%

9 jurnal.unej.ac.id
Internet Source

1%

10 jurnal.untan.ac.id
Internet Source

1%

11 repository.unisba.ac.id:8080
Internet Source

1%

12 ffarmasi.uad.ac.id
Internet Source

1%

13 juke.kedokteran.unila.ac.id
Internet Source

1%

14 Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar
Student Paper

1%

15 repository.setiabudi.ac.id
Internet Source

1%

16 Submitted to Udayana University
Student Paper

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off