

# POTENSI EFEK HIPNOTIK KOMBINASI INFUSA DAUN KANGKUNG DARAT (*Ipomea reptans* Poir.) DAN DAUN UBI JALAR (*Ipomea batatas* L.)

*by* Arik Dian Eka P

---

**Submission date:** 18-Mar-2021 06:19AM (UTC-0700)

**Submission ID:** 1536140038

**File name:** Revisi\_Artikel\_Arik\_Dian\_Eka\_P\_dkk.doc (112K)

**Word count:** 2196

**Character count:** 13665

## POTENSI EFEK HIPNOTIK KOMBINASI INFUSA DAUN KANGKUNG DARAT (*Ipomea reptans* Poir.) DAN DAUN UBI JALAR (*Ipomea batatas* L.)

Arik Dian Eka Pratiwi<sup>\*</sup>, A. Ariani Hesti W.S, Ebta Narasukma Anggraeny

Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang

Jl. Letjend Sarwo Edie Wibowo KM.1 Plamongansari-Pucanggading, Semarang

<sup>\*</sup>Email: arikdianekapratiwi@yahoo.co.id

### Abstrak

Banyaknya aktivitas cenderung menyebabkan kelelahan, gangguan tidur dan stres sehingga produktivitas manusia dapat menurun. Beberapa tanaman yang diyakini masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas tidur diantaranya daun ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.) dan daun kangkung darat (*Ipomea reptans* Poir). Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan kimia serta dosis efektif kombinasi infusa daun kangkung darat dan daun ubi jalar sebagai agen hipnotik. Dosis masing-masing tanaman yang dipakai adalah 48 mg/KgBB mencit dan 382 mg/KgBB mencit. Hewan uji sebanyak 25 ekor dibagi menjadi lima kelompok yaitu kontrol normal, kontrol positif dengan pemberian diazepam 1,3 mg/KgBB mencit per oral, kelompok perlakuan III dengan perbandingan dosis (1:1), kelompok IV (1:2) dan kelompok V (2:1). Rotary dipilih sebagai metode pengujian dalam penelitian ini. Analisis data yang digunakan yaitu memakai Shapiro-Wilk, selanjutnya uji one way ANOVA dan Post Hoc Tests. Penelitian menunjukkan bahwa daun ubi jalar dan daun kangkung darat mengandung senyawa flavonoid, steroid dan alkaloid yang diketahui memiliki aktivitas hipnotik. Efektivitas kemampuan hipnotik ditunjukkan pada kombinasi infusa dengan perbandingan dosis (1:1) yaitu infusa daun kangkung dengan dosis 48 mg/KgBB mencit dan infusa daun ubi jalar dengan dosis 382 mg/KgBB mencit.

**Kata kunci:** daun kangkung darat, daun ubi jalar, hipnotik

### PENDAHULUAN

Sebagian besar masyarakat mendambakan tidur yang berkualitas karena sangat membantu dalam mengurangi stres serta meningkatkan produktivitas dalam bekerja maupun aktivitas yang lain. Salah satu faktor penyebab kualitas pekerjaan dengan hasil yang memuaskan yaitu kualitas istirahat seseorang yang baik. Padatnya pekerjaan dapat menyebabkan sebagian orang stres dan memicu gangguan istirahat terutama kualitas tidur. Kondisi tersebut jika tidak tertangani maka dapat menurunkan produktivitas tubuh (Kundarto dan Pratiwi, 2018). Berdasarkan survei yang dilakukan setiap tahun, masalah terkait kesulitan tidur pada orang dewasa hampir mencapai 20%-40%. Akibatnya, sebagian orang (17%) mengalami masalah serius pada dirinya. Gangguan tidur yang terjadi pada masyarakat cenderung meningkat setiap tahunnya terutama pada populasi usia lanjut. Survei yang dilakukan oleh Kaplan (1997) pada populasi usia lanjut menunjukkan bahwa 40-50% menderita gangguan tidur.

Beberapa tahun belakangan ini banyak pemanfaatan tanaman sebagai obat tradisional dalam mengatasi masalah gangguan tidur. Beberapa tanaman yang diyakini masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas tidur, diantaranya kangkung darat (*Ipomoea reptans* Poir.) dan ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.). Daun kangkung maupun daun ubi jalar banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai sayuran dalam makanan. Selain itu, secara turun-temurun tanaman kangkung dimanfaatkan sebagai agen penstimulasi sedasi. Pengujian fitokimia yang dilakukan oleh Astuti (2018) pada ekstrak kasar kangkung didapatkan kandungan alkaloid, steroid, fenol dan hidrokuinon. Kandungan senyawa steroid, alkaloid dan flavonoid diketahui dapat meningkatkan rasa kantuk (Hidayati, 2013). Berdasarkan hasil penelitian Anggara (2009) didapatkan hasil penelitian ekstrak kangkung darat memiliki potensi sebagai efek sedatif dengan dosis 2 mg/KgBB setara dengan kontrol positif fenobarbital 6 mg/KgBB. Sedangkan menurut penelitian Syamsi dkk (2019) didapatkan hasil ekstrak kangkung air dengan dosis 4 mg/20gBB mencit memiliki efek sedasi yang setara dengan diazepam dosis 0,018 mg/20grBB mencit.

Tanaman ubi jalar (*Ipomoea batatas* L.) yang masih satu marga dengan kangkung secara empiris dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas tidur. Umumnya yang dimanfaatkan sebagai agen hipnotik adalah bagian daun. Efek sedatif daun ubi jalar dengan dosis

382 mg/KgBB pada penelitian yang dilakukan oleh Marfu'ah dkk (2013) diketahui memiliki efek yang sebanding dengan fenobarbital dosis 54,6 mg/KgBB. Sama seperti kangkung, menurut Meisyayati (2017), daun ubi jalar juga mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai antikonvulsan dan relaksan otot. Kandungan senyawa aktif dalam kedua daun tersebut tergolong dalam senyawa yang larut dalam pelarut polar yaitu flavonoid jenis quersetin (Wirasutisna dkk., 2012).

Dari data diatas maka peneliti akan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi kandungan fitokimia serta dosis efektif kombinasi infusa daun kangkung darat dan daun ubi jalar sebagai agen hipnotik.

## 8 ETODOLOGI

### 1. Bahan dan Alat

Kebutuhan bahan dalam penelitian ini adalah daun kangkung darat dan daun ubi jalar yang diperoleh dari perkebunan sayur Bandungan, Kab. Semarang. Mencit jantan galur wistar umur 60-90 hari dengan berat badan 20-35 g. Diazepam 10 mg, CMC Na 0,5% dan aquadest. Timbangan digital, blender, lemari pengering, ayakan mesh 40, beaker glass, batang pengaduk, gelas ukur 25 ml, infuspan, penangas, tabung rekasi, pipa kapiler, sonde mencit, timbangan ohaus, labu takar, gelas ukur, corong kaca, *rotaryroad*.

### 2. Pembuatan Infusa

Ditimbang 1 gram serbuk simplisia kering daun kangkung darat dan daun ubi jalar. Dimasukkan dalam infuspan, lalu ditambahkan aquadest. Dipanaskan hingga suhu didalam panci 90°C, catat waktu hingga 15 menit, sambil sesekali diaduk (sebagai colatur I). Kemudian ukur dengan gelas ukur. Ampas infusa dimasukkan dalam infuspan. Ditambahkan air panas dan diaduk. Saring dengan kain koladan dicampur dengan colatur I hingga 10 ml (Depkes RI, 1986).

### 3. Uji Kualitatif

#### a. Identifikasi Flavonoid

Dua mL metanol ditambahkan dalam masing-masing infusa selanjutnya mulut tabung ditutup rapat dan dikocok pelan selama 15 menit. Kedua campuran tersebut kemudian disaring menggunakan kertas saring dan filtrat diteteskan pada permukaan kertas saring sambil diuapi dengan amonia pekat. Kandungan flavonoid ditunjukkan dengan warna kuning atau jingga pada kertas saring.

#### b. Identifikasi Alkaloid

Beberapa tetes larutan HCl 2N dicampurkan dalam masing-masing 1 mL infusa dan tiap infusa dibagi dalam 3 tabung rekasi. Tabung I ditambahkan pereaksi Dragendorff, tabung II ditambahkan pereaksi Wagner dan tabung III dengan pereaksi Mayer. Timbulnya endapan cokelat pada pereaksi Wagner, endapan merah pada pereaksi Dragendorff dan endapan putih pada pereaksi Mayer menunjukkan adanya senyawa alkaloid.

#### c. Identifikasi Steroid

Sebanyak 10 tetes CH<sub>3</sub>COOH glasial dan 2 tetes H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> pekat ditambahkan dalam 1 mL infusa daun kangkung darat dan infusa daun ubi jalar. Campuran larutan dikocok secara perlahan dan ditunggu selama beberapa menit sampai terbentuk warna biru atau hijau. Terbentuknya warna tersebut menunjukkan positif steroid.

#### d. Identifikasi Tanin

Sebanyak 1 mL infusa daun kangkung darat dan infusa daun ubi jalar dimasukkan dalam tabung reaksi, lalu ditambahkan FeCl<sub>3</sub> 1%. Adanya senyawa tanin ditunjukkan dengan timbulnya warna biru tua atau hitam kehijauan.

#### e. Identifikasi Saponin

Sebanyak 1 mL kombinasi infusa daun kangkung darat dan daun ubi jalar dimasukkan dalam tabung rekasi lalu dipanaskan dan ditambahkan 10 mL air panas, tunggu sampai dingin

kemudian dikocok kuat sekitar 30 detik. Positif saponin jika timbul busa secara konsisten disertai dengan penambahan 1 tetes HCl 2N tetap membentuk busa.

#### 4. Pembuatan Suspensi CMC Na 0,5%

Sebanyak 0,25 gram CMC-Na yang telah ditimbang kemudian ditaburkan merata di atas 5 mL aquadest panas dalam cawan porselen. Ditunggu sekitar 15 menit sampai diperoleh mssa yang berbentuk transparan. Selanjutnya diaduk sampai terbentuk seperti basis gel kemudian ditambahkan dengan aquadest sedikit demi sedikit dan dituang dalam labu takar 50,0 mL, ditambahkan aquadest sampai petunjuk batasnya. Suspensi ini digunakan sebagai kontrol normal.

#### 5. Pembuatan Suspensi Diazepam

Dibuat larutan stok diazepam dosis 1,3 mg/kgBB mencit, dengan menimbang diazepam 55 mg dan CMC-Na 0,5% 0,25 gram lalu dikembangkan dengan aquadest panas 20 kali bobot diazepam dalam cawan porselen. Didiamkan 10 menit sampai mengembang. Selanjutnya, dimasukkan diazepam dalam larutan CMC-Na diaduk hingga homogen. dituang dalam labu takar 50,0 mL, ditambahkan aquadest sampai petunjuk batasnya. Suspensi ini digunakan sebagai kontrol positif.

#### 6. Persiapan Hewan Uji dan Pengujian

Pengujian mencit jantan galur Wistar yang masuk kriteria inklusi sehat, usia 60-90 hari dengan berat badan 20-30 g diadaptasikan selama 1 minggu di dalam kandang dan diberi makanan. Sebanyak 25 ekor mencit dikelompokkan menjadi 5 kelompok, kelompok kontrol normal diberikan CMC Na 0,5%, kontrol positif diberikan diazepam 1,3 mg/KgBB mencit sedangkan tiga kelompok perlakuan diberikan kombinasi infusa daun kangkung darat dan daun ubi jalar. Dosis untuk infusa daun kangkung darat 48 mg/KgBB mencit dan infusa daun ubi jalar 382 mg/KgBB mencit. Perbandingan untuk dosis uji adalah 1:1, 1:2 dan 2:1. Masing-masing kelompok dibuat 5 kali replikasi. Mencit diamati saat terjatuh dari *rotaryroad*. Waktu jatuh hewan uji dihitung menggunakan *stopwatch timer* dari awal alat *rotaryroad* dihidupkan sampai mencit terjatuh kemudian dihitung berapa lama mencit dapat bertahan pada putaran *rotaryroad*.

#### 7. Analisis Data

Data waktu jatuh dari *rotaryroad* dianalisis menggunakan *Shapiro-Wilk*, selanjutnya uji *one way ANOVA* dan *Post Hoc Tests* dengan  $p < 0,05$  untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar kelompok.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Rata-Rata Waktu Jatuh Mencit dari *Rotaryroad* (Menit)

Replikasi	Kontrol Positif	Kontrol Normal	Perbandingan 1:1	Perbandingan 1:2	Perbandingan 2:1
1	0,2	5,9	0,2	0,1	0,1
2	0,1	5,5	0,2	0,1	0,1
3	0,1	5,2	0,1	0,2	0,1
4	0,3	4,8	0,2	0,1	0,2
5	0,2	5,1	0,1	0,2	0,2
<i>Mean±SD</i>	0,18±0,007	5,3±0,175	0,16±0,003	0,14±0,003	0,14±0,003

Efek hipnotik yang ditimbulkan dari pemberian kombinasi infusa diamati pengaruhnya terhadap kemampuan motorik mencit yang dilihat dari waktu jatuh hewan uji. Pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kelompok perbandingan 1:1, 1:2 dan 2:1 menggambarkan waktu tercepat untuk jatuh, kemudian diikuti kelompok kontrol positif dan kontrol normal. Hal ini didukung dengan

penelitian dari Anggara (2009) yang menyatakan bahwa waktu jatuh pada *rotaryroad* kelompok ekstrak kangkung darat lebih cepat dibandingkan kontrol normal.

Berdasarkan analisis uji *post hoc* untuk waktu jatuh menunjukkan perbedaan yang signifikan ( $p < 0,05$ ) antara kelompok kontrol normal dengan ketiga kelompok perlakuan. Rata-rata waktu jatuh kelompok kontrol normal paling cepat daripada perlakuan. Di sisi lain, hasil uji didapatkan tidak adanya perbedaan yang signifikan ( $p > 0,05$ ) antara kelompok kontrol positif dengan ketiga kelompok perlakuan sampel kombinasi infusa. Begitu juga antar kelompok perlakuan sampel mendapatkan hasil ketiganya tidak berbeda signifikan dalam menimbulkan efek hipnotik sehingga dapat dikatakan bahwa dosis yang paling efektif memberikan efek hipnotik adalah kombinasi infusa daun kangkung darat dan daun ubi jalar dengan perbandingan dosis 1:1 karena memiliki efektivitas yang sebanding dengan kontrol positif diazepam dosis 1,3 mg/KgBB mencit. Hasil dapat dilihat dari Tabel 2.

**Tabel 2. Hasil Uji Post Hoc Antar Kelompok**

Kelompok	Nilai p
Kontrol Positif vs Kombinasi 1:1	0,729
Kontrol Positif vs Kombinasi 1:2	1,000
Kontrol Positif vs Kombinasi 2:1	0,419
Kontrol Normal vs Kombinasi 1:1	0,008*
Kontrol Normal vs Kombinasi 1:2	0,009*
Kontrol Normal vs Kombinasi 2:1	0,008*
Kombinasi 1:1 vs Kombinasi 1:2	0,729
Kombinasi 1:1 vs Kombinasi 2:1	0,549
Kombinasi 1:2 vs Kombinasi 2:1	0,419

Tabel 3 merupakan hasil skrining fitokimia daun ubi jalar dan daun kangkung darat. Pengujian menghasilkan kedua tanaman tersebut mengandung senyawa saponin, steroid, flavonoid, tanin dan alkaloid. Hal tersebut sesuai dengan pengujian yang dilakukan oleh Astuti (2018), didapatkan kandungan fenol, alkaloid, hidrokuinon dan steroid pada ekstrak kasar kangkung. Kandungan senyawa alkaloid, steroid dan flavonoid diketahui dapat meningkatkan rasa ketuk (Hidayati, 2013). Adanya kuersetin (flavonoid) pada kangkung dapat memberikan efek di pusat inhibisi pada *formation reticularis* dan memodulasi reseptor GABA serta *liganion gated channel* dalam sistem saraf pusat. Akibatnya, mekanisme tersebut dapat menghambat impuls penghantar dan menyebabkan perlambatan reaksi (Sutio, 2012)

**Tabel 3. Hasil Skrining Fitokimia Daun Kangkung Darat dan Daun Ubi Jalar**

Golongan Senyawa	Hasil	
	Daun Kangkung Darat	Daun Ubi Jalar
Flavonoid	+	+
Alkaloid	+	+
Tanin	+	+
Saponin	+	+
Steroid	+	+

Keterangan : (+) mengandung senyawa tersebut

Daun ubi jalar tergolong satu marga dengan kangkung sehingga memiliki kandungan senyawa yang hampir sama, salah satunya flavonoid. Substansi ini berperan menurunkan muatan listrik neuro karena muatan listrik yang berlebihan dapat memicu kejang. Mekanisme kerja yang lain dengan memodulasi reseptor GABA<sub>A</sub> dengan cara meningkatkan aksi GABA dalam membuka saluran ion klorida (Cl<sup>-</sup>). Menurut Meisyayati dkk (2017), ditemukan hasil bahwa daun ubi jalar selain memiliki efek sebagai penenang dan relaksan otot, senyawa flavonoid yang dikandungnya juga dapat memodulasi GABA<sub>A</sub>.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa daun kangkung darat dan daun ubi jalar mengandung senyawa alkaloid, flavonoid dan steroid yang diketahui memiliki aktivitas hipnotik. Efektivitas kemampuan hipnotik ditunjukkan pada kombinasi infusa dengan perbandingan dosis (1:1) yaitu infusa daun kangkung dengan dosis 48 mg/KgBB mencit dan infusa daun ubi jalar dengan dosis 382 mg/KgBB mencit.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi Semarang atas bantuan pendanaan pada penelitian ini serta terima kasih untuk Elisabeth, Cicilia Wahyu dan Dhyah Ayu atas kerja samanya selama penelitian berlangsung.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, R., (2009), Pengaruh Ekstrak Kangkung Darat (*Ipomea reptans* Poir.) Terhadap Efek Sedasi Pada Mencit Balb/c, Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang
- Astuti, K, I., dan Fitriyanti, (2018), Uji Potensiasi Efek Sedatif-Hipnotik Ekstrak Etanol Kangkung Air (*Ipomea aquatic*) Asal Gambut Kalimantan Selatan, Borneo Journal of Pharmascitech, 02, pp. 59-64
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, (1986), Sediaan Galenik. Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta
- Hidayati, A., (2013), Uji Efek Sedatif Ekstrak *N*-Heksan Dari Daun Kratom (*Mitragyna speciosa* Korth.) Pada Mencit Jantan Galur Balb/c, Skripsi, Universitas Tanjungpura, Pontianak
- Kaplan, S., (1997), Sinopsis Psikiatri: Ilmu Pengetahuan Perilaku Psikiatri Khas, Jilid 1, Edisi 7, Bina Putra Aksara, Jakarta, pp.675-676
- Kundarto, W dan Pratiwi, A.A., (2018), Potensi Ekstrak Daun Kangkung Darat (*Ipomoea reptans* L.) sebagai Agen Sedatif Herbal, Journal Of Pharmaceutical Science And Clinical Research, 01, pp.12-17.
- Marfu'ah, I., Sudarso, dan Diniatik, (2013), Efek Sedasi Dari Variasi Dosis Ekstrak Etanol Daun Ubi Jalar (*Ipomoea batatas* L) Pada Mencit, Jurnal Pharmacy, 10, pp. 1-15
- Meisyayati, S., Erjon, Zizba, O.G., (2017), Standarisasi Dan Efek Antikonvulsi Ekstrak Etanol Daun Ubi Jalar Pada Mencit Putih Jantan, Jurnal Penelitian Farmasi Indonesia, 05, pp. 48-54
- Sutio, R., (2012), Pengaruh Kukusan Daun Kangkung Air (*Ipomoea aquatica*) terhadap Kewaspadaan dan Ketelitian pada Pria Dewasa, Skripsi, Universitas Maranatha, Bandung
- Syamsi, Nur, Alfia, Andi dan Lestari, N.H., (2019), Uji Efek Sedasi Ekstrak Kangkung Air (*Ipomoea Aquatic*) Pada Mencit (*Mus Musculus*), Jurnal Kesehatan Tadulako, 05, pp. 49-53
- Wirasutisna, K.R., Nawawi, A., dan Sari, N., (2012), Telaah Fitokimia Daun Kangkung Air (*Ipomea aquatica* Forsskal), Acta Pharmaceutica Indonesia, 27, pp. 39-42

# POTENSI EFEK HIPNOTIK KOMBINASI INFUSA DAUN KANGKUNG DARAT (*Ipomea reptans* Poir.) DAN DAUN UBI JALAR (*Ipomea batatas* L.)

## ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jurnalstikesborneolestari.ac.id">jurnalstikesborneolestari.ac.id</a> Internet Source	4%
2	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	3%
3	<a href="http://repository.setiabudi.ac.id">repository.setiabudi.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://jurnal.uns.ac.id">jurnal.uns.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://jurnalnasional.ump.ac.id">jurnalnasional.ump.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://idoc.pub">idoc.pub</a> Internet Source	1%

9	<a href="http://publikasiilmiah.unwahas.ac.id">publikasiilmiah.unwahas.ac.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://rubi77botani.wordpress.com">rubi77botani.wordpress.com</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://jurnal.untan.ac.id">jurnal.untan.ac.id</a> Internet Source	1%
12	<a href="http://sintadev.ristekdikti.go.id">sintadev.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://ejournal.stifar-riau.ac.id">ejournal.stifar-riau.ac.id</a> Internet Source	1%
15	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
16	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	1%
17	<a href="http://jkb.ub.ac.id">jkb.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
18	<a href="http://repository.wima.ac.id">repository.wima.ac.id</a> Internet Source	1%
19	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	<1%

20

repository.usd.ac.id

Internet Source

<1%

21

riset.unisma.ac.id

Internet Source

<1%

22

core.ac.uk

Internet Source

<1%

23

ejournal2.undip.ac.id

Internet Source

<1%

24

Harry Noviardi, Triyani Sumiati, Patoni Patoni.  
"Potensi antiinflamasi ekstrak etanol daun bisbul  
(Diospyros discolor Willd) terhadap edema  
mencit putih jantan (Mus musculus) terinduksi  
karagenan", Riset Informasi Kesehatan, 2019

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off